

Flóra Mývatnssveitar.


HELGI JÓNASSON
Gvendarstöðum í Köldukinn

ABSTRACT: The flora of the area around Lake Mývatn, northern Iceland, consists of 246 species of vascular plants. The floristic list below is based upon field observations and collections made by the author in the area during the summers of 1934–1936. A number of additional informations were made available by Steindór Steindórsson and others. Distribution data are given for every species within the area, classified as *alg.* (common), *viða* (widespread), *allviða* (rather widespread), *hér og þar* (here and here), *óviða* (rather rare) and *sj.* (rare).

Tegundaskrá sú, sem hér fer á eftir, er byggð á rannsóknarferðum Helga Jónassonar um Mývatnssveit sumrin 1934–1936 að viðbættum heimildum úr plöntulista frá Mývatnssveit, sem Steindór Steindórsson skóla-meistari hefur samið og góðfúslega leyft höfundu að nota. Rannsóknarferðir Helga voru styrktar af Menningarsjóði.

Þar sem liðlega 35 ár eru nú liðin síðan athugunarferðir þessar voru farnar, má ganga út frá því sem vísu, að einhverjar breytingar hafi orðið á útbreiðslu plantna í Mývatnssveit síðan. Ef til vill hafa einhverjar tegundir horfið af sínum fyrri vaxtarstöðum vegna búsetu og ræktunar. Eflaust hafa ýmsir slæðingar aukið útbreiðslu sína síðan þessi listi var gerður og aðrir bætt við, sem ekki eru hér taldir. Slæðinga, sem ekki eru flendir, er getið innan hornklofa.

Plöntuskráin nær yfir byggðina umhverfis Mývatn og næsta nágrenni hennar. Þetta svæði er nokkurn veginn afmarkað með útlínum meðfylgjandi korts (1. mynd). Utan þess er tekið með nokkurt svæði norðan og austan við Reykjahlíð, en það er Hlíðardalur, Leirhnjúkur og Krafla. Um það svæði hefur Steindór Steindórsson farið. Þá eru



1. MYND. Kort yfir umhverfi Mývatns með helztu fundarstöðum.

einstakir fundarstaðir aðrir teknir með (Bláhvammur, H. Kr.; Gæsadalur, A. G. og St. Std.; Bóndhólshraun, A. G.).

Að sjálfsgöðu gerir flóru-listi sem þessi enga kröfu til að verða talinn fullkominn, og er ekki að efa, að kunnugir muni geta bætt ýmsu við hann. Vonast er til, að prentun listans örvi bæði heimamenn og aðra til að bæta við hann og auka þannig við þekkingu manna á plönturíki Mývatnssveitar. Ekki hafa heldur verið tók á að fara í gegn um þau plöntusöfn, sem til eru frá Mývatnssveit, og kunna því einhverjar viðbætur að leynast í þeim.

Þar sem heimildir eru fengnar að láni eftir öðrum, er finnanda getið innan sviga aftan við nafn fundarstaðar. Skammstafanir heimildarmanna eru notaðar sem hér segir: A. G., Arnþór Garðarsson; E. E., Eyþór Einarsson; H. Hg., Helgi Hallgrímsson; H. Kr., Hörður Kristinsson; J. B. S., Jón Baldur Sigurðsson; St. Std., Steindór Steindórsson. Allir fundarstaðir án tilvísana eru eftir handriti Helga Jónassonar. Uppgefin tíðni plantnanna í handriti hefur verið samræmd og lagfærð eftir því sem upplýsingar annarra heimildarmanna gáfu tilefni til. Sömuleiðis voru hin latnesku heiti tegundanna samræmd eftir nýtri flórum, og þá einkum stuðzt við Nordisk Kärlyväxtflora eftir Hylander, og Grænlandsflóru Böcher, Holmen og Jakobsen.

Ritstjóri.

TEGUNDASKRÁ

OPHIOGLOSSACEAE

1. *Ophioglossum azoricum* C. Presl., naðurtunga. — Sj. Jarðbaðshólar, á nokkrum stöðum í nánd við hitaholur; Námafjall (St. Std.); Krafla (St. Std.).
2. *Botrychium lunaria* (L.) Sw., tungljurt. — Alg.
3. *B. lanceolatum* (Gmel.) Ångstr., lensutungljurt. — Sj. Grímsstaðir (St. Std.).

POLYPODIACEAE

4. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh., tófugras. — Alg.
5. *Lastraea dryopteris* (L.) Bory, þrflaufungur. — Óvíða. Vogar, Reykjahlíð, Stóragjá. Hér og hvar um hraunin.
6. *L. phegopteris* (L.) Bory, þríhyrnuburkni. — Sj. Stóragjá og annar hellir í nánd.
7. *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray, díflaburkni. — Sj. Haganes, á tveim stöðum í hraunholum; Stóragjá, á einum stað; Geirastaðir.
8. *Polystichum ionchitis* (L.) Roth., skjaldburkni. — Sj. Reykjahlíð, í volgum helli; við Leirhnjúk, í hraunsprungu (H. Hg.).

EQUISETACEAE

9. *Equisetum arvense* L., klóelfting. — Alg.
10. *E. pratense* Ehrh., vellefting. — Alg.
11. *E. palustre* L., mýrelfting. — Alg.
12. *E. fluviatile* L., fergin. — Óvíða. Gautlönd, Baldursheimur, Garður.
13. *E. variegatum* Schleich., beitieski. — Alg.
14. *E. hiemale* L., eski. — Óvíða. Litlaströnd, Námafjall (St. Std.), Krafla (St. Std.).

LYCOPODIACEAE

15. *Lycopodium selago* L., skollafingur. — Sj. (St. Std.).

SELAGINELLACEAE

16. *Selaginella selaginoides* (L.) Link., mosajafni. — Alg.

CUPRESSACEAE

17. *Juniperus communis* L., einir. — Allvíða. Hér og þar um hraunin austan vatns, Vogar, víða í birkiskógi við Sandvatn (A. G.), suðurhlíðar Belgjarfjalls (J. B. S.), Bóndhólshraun (A. G.), Hofstaðir (A. G.), Hofstaðaei (H. Hg.).

JUNCAGINACEAE

18. *Triglochin palustre* L., mýrasauðlaukur. — Allvíða, stórvaxinn í volgum leirflögum.

POTAMOGETONACEAE

19. *Potamogeton filiformis* Pers., þráðnykra. — Alg.
 20. *P. pusillus* L., smánykra. — Allvíða. Arnarvatn, Sveinsströnd, Baldursheimur, Stakhólstjörn, Garður, Vogar, Slý (St. Std.).
 21. *P. alpinus* Balb., fjallnykra. — Sj. Gautlönd, Vindbelgur.
 22. *P. gramineus* L., grasnykra. — Óvíða. Arnarvatn; Baldursheimur; Garður, í tjörn og í Mývatni.
 23. *P. praelongus* Wulf., langnykra. — Óvíða. Stakhólstjörn; Garður, á nokkrum stöðum; Kálfaströnd.
 24. *P. perfoliatus* L., hjartanykra. — Alg.

ZANNICHELLIACEAE

25. *Zannichellia palustris* L., hnotsörvi. Við Löndin í Mývatni frá Auðnum norður fyrir Reykjahlíð, þar sem jarðylur er; Kálfstjörn.

GRAMINEAE

26. *Nardus stricta* L., finnungur. — Alg.
 27. *Elytrigia repens* (L.) Nevski, húsapuntur. — Sj. Gautlönd.
 28. *Elymus arenarius* L., melur. — Óvíða. Í sandinum frá Garði og Grænavatni austur í Villingafjall.
 29. *Anthoxanthum odoratum* L., ilmreyr. — Alg.
 30. *Alopecurus pratensis* L., háliðagras. — Alg. í túnnum (H. Hg., H. Kr.).
 31. *A. geniculatus* L., knjáliðagras. — Sj. Framengjar.
 32. *A. aequalis* Sobol, vatnsliðagras. — Hofstaðir (H. Hg.).
 33. *Phleum pratense* L., vallafoxgras. — Alg. í túnnum (H. Hg., H. Kr.).
 34. *P. commutatum* Gaud., fjallafoxgras. — Alg.
 35. *Hierochloë odorata* (L.) Wg., reyrgresi. — Víða.
 36. *Milium effusum* L., skrautpuntur. — Sj. Stóragjá, Slútnes.
 37. *Agrostis tenuis* Sibth., hálfngresi. — Alg.
 38. *A. stolonifera* L., skriðlíngresi. — Alg.
 39. *A. canina* L., týtulíngresi. — Alg.
 40. *Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) G. M. & Sch., hálmngresi. — Alg.
 41. *Deschampsia caespitosa* (L.) PB., snarrótarpuntur. — Víða.
 42. *D. alpina* (L.) R. & S., fjallapuntur. — Sj. Gautlönd, Baldursheimur.
 43. *D. flexuosa* (L.) Richt., lógresi. — Alg.
 44. *Trisetum spicatum* (L.) Richt., lógresi. — Alg.
 45. *Catabrosa aquatica* (L.) PB., vatnsnarvagas. — Allvíða. Arnarvatn, Baldursheimur, Vogar, Reykjahlíð.
 46. *Poa annua* L., varpasveifgras. — Alg. við bæi.
 47. *P. nemoralis* L., kjarasveifgras. — Sj. Villingafjall, Hofstaðir (H. Hg.).
 48. *P. glauca* Vahl, blásveifgras. — Alg.
 49. *P. alpina* L., fjallasveifgras. — Alg.

50. *P. pratensis* L., vallarsveifgras. — Alg.
 51. *P. trivialis* L., hásvweifgras. Sj. — Reykjahlíð (St. Std.).
 52. *Puccinellia retroflexa* (Curt.) Holmb., varpafitjungur. — Sj. Garður, Vogar, Reykjahlíð (St. Std.).
 53. *Festuca rubra* L., túnvíngull. — Alg.
 54. *F. vivipara* (L.) Sm., blávíngull. — Alg.

CYPERACEAE

55. *Eriophorum scheuchzeri* Hoppe, hrafnafffa. — Víða. Rifshöfði (E. E.), mikið á Sveinsströnd, alg. í Vindbelgjarskógum (E. E.).
 56. *E. angustifolium* Honck., klóffifa. — Hér og þar.
 57. *Eleocharis palustris* (L.) R. & S., vatnsnál. — Sj. Reykjahlíð.
 58. *E. quinqueflora* (F. X. Hartm.) O. Schwarz, fitjafinnungur. — Sj. Skútustaðir (St. Std.), Neslönd.
 59. *E. acicularis* (L.) R. & S., vatnsnæli. — Allvíða. Arnarvatn, Baldursheimur, Grænavatn, Vogar, Reykjahlíð.
 60. *Trichophorum caespitosum* (L.) Hartm., mýrafinnungur. — Á nokkrum stöðum.
 61. *Kobresia myosuroides* (Vill.) Fiori & Paol., þursaskegg. — Alg.
 62. *Carex diodica* L., tvíþýlisstör. — Sj. Stekkjarmýri hjá Baldursheimi.
 63. *C. capitata* Sol., hnappstör. — Alg.
 64. *C. microglochin* Wg., broddastör. — Alg.
 65. *C. rupestris* All., móastör. — Alg.
 66. *C. chordorrhiza* L., vetrarkvíðastör. — Alg.
 67. *C. maritima* Gunn., bjúgstör. — Allvíða, einkum í sandinum austan vatns hjá Garði og Grænavatni.
 68. *C. macloviana* d'Urv., kollstör. Allvíða. Gautlönd, Haganes, Skútustaðir (A. G.), Garður, Kálfaströnd (A. G.), Slútnes, Hlíðardalur (St. Std.), Sviðinsey, Hofstaðaei (H. Hg.).
 69. *C. brunnescens* (Pers.) Poir, línstör. — Sj. Skútustaðir (Fl. Ísl.).
 70. *C. canescens* L., blátoppastör. — Óvíða. Rifshöfði (E. E.), Baldursheimur við tjörnina, Skútustaðir (J. B. S.), Slútnes (St. Std.).
 71. *C. lachenalii* Schkuhr., rjúpustör. — Óvíða. Sviðinsey; hér og þar til fjalla (St. Std.).
 72. *C. norvegica* Retz., fjallastör. — Óvíða. Gautlönd, Baldursheimur, Skútustaðir, Höfði, Hofstaðir og Hofstaðaei (H. Hg.).
 73. *C. atrata* L., sótsör. — Allvíða. Rifshöfði (E. E.), Baldursheimur, Skútustaðir (St. Std.), Garður, Höfði (H. Kr.), Slútnes, Belgur, Sviðinsey, Hofstaðir og Hofstaðaei (H. Hg.).
 74. *C. glacialis* Mack., dvergstör. — Alg., einkum í hraununum austan vatns.
 75. *C. capillaris* L., hárleggjastör. — Víða.
 76. *C. vaginata* Tausch., slíðrastör. — Víða.
 77. *C. limosa* L., flóastör. — Sj. Framengjar við Skútustaði (A. G.).
 78. *C. rariflora* (Wg.) Sm., hengistör. — Víða.
 79. *C. oederi* Retz., gullstör. — Sj. Belgjarskógur á nokkrum stöðum.
 80. *C. rostrata* Stokes, tjarnastör. — Víða.
 81. *C. saxatilis* L., hrafnastör. — Sj. Belgjarskógur á nokkrum stöðum.
 82. *C. nigra* (L.) Reich., mýrastör. — Alg.
 83. *C. lyngbyei* Horn., gulstör. — Alg., einkum í Framengjum.
 84. *C. bigelowii* Torr., stinnastör. — Alg.
 85. *C. bicolor* All., hvítstör. — Sj. Krafla (St. Std.).

JUNCACEAE

86. *Juncus filiformis* L., þráðsef. — Alg. vestan við vatnið, minna austan við.
 87. *J. arcticus* Willd. ssp. *intermedius* Hyl., hrossanál. — Alg.
 88. *J. trifidus* L., móasef. — Alg.
 89. *J. triglumis* L., blómsef. — Allvíða.
 90. *J. biglumis* L., flagasef. — Allvíða.
 91. *J. alpinus* Vill., mýrasef. — Alg.
 92. *J. articulatus* L., laugasef. — Sj. Vogar, Reykjahlíð.
 93. *J. ranarius* Perr. & Song., lindasef. — Allvíða. Arnarvatn, Baldursheimur, Garður, Vogar, Neslandatangi.
 94. *Luzula spicata* (L.) DC., axhæra. — Víða ofan við vatnið, en sjaldgæf neðan við það.
 95. *L. arcuata* (Wg.) Sw., fjallhæra. — Víða til fjalla (St. Std.).
 96. *L. multiflora* (Retz.) Lej., vallhæra. — Alg.
 97. *L. sudetica* (Willd.) D. C., dökkhæra. — Óvíða. Álftagerði (A. G.), Gæsadalur (A. G.), Hofstaðir (H. Hg.).

SPARGANIACEAE

98. *Sparganium minimum* Wallr., tjarnabrúsi. Sj. Vogar, Slý.
 99. *S. hyperboreum* Laest., mógrafabrúsi. — Óvíða.
 100. *S. angustifolium* Michx., trjónubrúsi. — Sj. Nónhólstjörn á Kálfaströnd, Vagnbrekka.

LILIACEAE

101. *Tofieldia pusilla* (Michx.) Pers., sýkigras. Alg.
 102. *Paris quadrifolia* L., ferlaufasmári. — Sj. Stóragjá, Slútnes, Skipalagshólmi í Laxá (H. Hg.).

ORCHIDACEAE

103. *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, brönugras. — Sj. Vogahraun.
 104. *Coeloglossum viride* (L.) Hartm., barnarót. — Víða.
 105. *Platanthera hyperborea* (L.) Lindbl., friggjargras. — Alg.
 106. *Leucorchis albida* (L.) E. Mey., hjónagras. — Hér og þar.
 107. *Corallorhiza trifida* Chat., kræklurót. — Sj. Grænavatn (J. B. S.), Reykjahlíð.

SALICACEAE

108. *Salix glauca* L., grávíðir. — Alg.
 109. *S. lanata* L., loðvíðir. — Alg.
 110. *S. herbacea* L., grasvíðir. — Alg.
 111. *S. phylicifolia* L., gulvíðir. — Alg.

BETULACEAE

112. *Betula nana* L., fjalldrapi. — Alg.
 113. *B. pubescens* Ehrh., ilmbjörk. — Víða austan, norðan og vestan við vatn. Á einum stað í Framengjum (A. G.).

URTICACEAE

- [*Urtica urens* L., brenninetla. — Sj. Kálfaströnd].

POLYGONACEAE

114. *Rumex longifolius* D. C., njóli. — Óvíða. Höfði, Vogar, Reykjahlíð.
 115. *R. acetosa* L., túnsúra. — Alg.

116. *R. acetosella* L., hundasúra. — Sj. Álftagerði (A. G.).
 117. *Oxyria digyna* (L.) Hill., ólafssúra. — Víða.
 118. *Koenigia islandica* L., naflagras. — Sj. Hofstaðir (H. Hg.).
 119. *Polygonum viviparum* L., kornsúra. — Alg.
 120. *P. aviculare* L., blóðarfi. — Alg. við bæi; Kráká langt sunnan við Baldursheim.

PORTULACACEAE

121. *Montia fontana* L., lækjagrýta. — Víða.

CARYOPHYLLACEAE

122. *Stellaria media* (L.) Vill., haugarfi. — Alg. við bæi.
 123. *S. crassifolia* Ehrh., stjörnuarfi. — Víða.
 124. *Cerastium cerastoides* (L.) Britton, lækjafræhyrna. — Alg.
 125. *C. alpinum* L., músareyra. — Alg.
 126. *C. fontanum* Baumg., vegarfi. — Alg.
 127. *Sagina nodosa* (L.) Fenzl., hnúskakrækill. — Alg.
 128. *S. saginoides* (L.) Karst., langkrækill. — Víða.
 129. *S. procumbens* L., skammkrækill. — Alg.
 130. *Minuartia rubella* (Wg.) Hiern., melanóra. — Alg.
 131. *M. biflora* (L.) Sch. & Thell., fjallanóra. — Sj. Krafla (St. Std.).
 132. *Arenaria norvegica* Gunn., skeggsandi. — Allvíða.
 133. *Silene maritima* With., holurt. — Alg.
 134. *S. acaulis* (L.) Jacq., lambagras. — Alg.
 135. *Viscaria alpina* (L.) G. Don., ljósberi. — Alg.

RANUNCULACEAE

136. *Ranunculus acris* L., brennisóley. — Alg.
 137. *R. pygmaeus* Wg., dvergsóley. — Sj. Krafla (St. Std.).
 138. *R. hyperboreus* Rottb., sefbrúða. — Víða.
 139. *R. reptans* L., liðaskriðsóley. — Alg.
 140. *R. trichophyllus* Chaix, lónasóley. — Alg.
 141. *Caltha palustris* L., lækjasóley. — Alg.
 142. *Thalictrum alpinum* L., brjóstagras. — Alg.

CRUCIFERAE

143. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Med., hjartarfi. — Alg.
 144. *Subularia aquatica* L., alurt. — Sj. Smiðjutjörn.
 145. *Draba incana* L., grávorblóm. — Alg.
 146. *D. norvegica* Gunn., hagavorblóm. — Víða.
 147. *D. nivalis* Liljeb., héluvorblóm. — Óvíða. Arnarvatn, Gautlönd, Jarðbaðshólar, Krafla (St. Std.), Belgjarfjall, Hofstaðir (H. Hg.).
 148. *Erophila verna* (L.) Besser, vorperla. — Alg.
 149. *Cardamine nymanii* Gaud., hrafnaklukka. — Alg.
 150. *Arabis alpina* L., skriðnablóm. — Allalg.
 151. *Cardaminopsis petraea* (L.) Hiit., melskriðnablóm. — Alg.
 152. *Rorippa islandica* (Oeder) Borb., kattarjurt. — Allvíða. Við Kráká sunnan við Baldursheim, Einslækur, meðfram Mývatni að austan, víða vestan við vatn, á nokkrum stöðum meðfram Laxá (H. Hg.).
 153. *Erysimum hieraciifolium* L., mývatnsdrottning. — Víða. Skútustaðir (H. Kr.), Höfði, Reykjahlíð, Sviðinsey, alg. um eyjarnar (St. Std.).

CRASSULACEAE

154. *Sedum acre* L., helluhnoðri. — Óvíða. Arnarvatn, Haganes (A. G.), Skútustaðir, Villingafjall, Höfði, Belgjarfjall.
 155. *S. annuum* L., skriðuhnoðri. — Óvíða. Haganes (A. G.), Kálfaströnd, Höfði, Vogar (St. Std.), Sviðinsey.
 156. *S. villosum* L., meyjarauga. — Óvíða.
 157. *S. roseum* (L.) Scop., burnirót. — Sj. Garður og Höfði í bæjarveggjum, aðflutt en óvíst hvaðan; Gæsadalur (St. Std.).

SAXIFRAGACEAE

158. *Saxifraga caespitosa* L., þúfusteinbrjótur. — Víða.
 159. *S. hypnoides* L., mosasteinbrjótur. — Óvíða.
 160. *S. cernua* L., laukasteinbrjótur. — Sj. Krafla (St. Std.), Vagnbrekka.
 161. *S. rivularis* L., lækjasteinbrjótur. — Sj. Syðri Neslönd.
 162. *S. oppositifolia* L., vetrarblóm. — Alg.
 163. *S. hirculus* L., gullbrá. — Sj. Stekkjarmýri við Baldursheim, Belgjarfjall.
 164. *S. nivalis* L., snæsteinbrjótur. — Óvíða.
 165. *S. stellaris* L., stjörnusteinbrjótur. — Óvíða.
 166. *Parnassia palustris* L., mýrasóley. — Alg.

ROSACEAE

[*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., mjaðjurt. — Aðeins í görðum, Gautlönd, Höfði.]

167. *Fragaria vesca* L., jarðarber. — Allvíða. Skútustaðir, Garður, Höfði; Vogar; Reykja-hlíð; Skipalaxhólmi, sennilega aðflutt (H. Hg.).
 168. *Sibbaldia procumbens* L., fjallasmári. — Allvíða, einkum til fjalla.
 169. *Comarum palustre* L., engjarós. — Alg.
 170. *Potentilla anserina* L., tágamura. — Alg. austan vatns frá Vogum að Grímsstöðum, Neslandatangi (A. G.). Ófundin annars staðar.
 171. *P. crantzii* (Cr.) G. Beck., gullmura. — Alg.
 172. *Geum rivale* L., fjalldalafífill. — Alg.
 173. *Dryas octopetala* L., holtasóley. — Alg.
 174. *Rubus saxatilis* L., hrútaberjalyng. — Alg. austan vatns, sj. að vestan.
 175. *Alchemilla alpina* L., ljónslappi. — Alg.
 176. *A. filicaulis* Bus., marfustakkur. — Alg.
 177. *A. glomerulans* Bus., hnoðamariustakkur. — Sj. Slútnes (St. Std.).
 178. *Sorbus aucuparia* L., ilmreynir. — Sj. Bláhvammur (H. Kr.), Slútnes (St. Std.), á eyjum í Laxá (H. Hg.).

PAPILIONACEAE

179. *Vicia cracca* L., umfeðmingur. — Sj. Við Kálfstjörn í Vogum.
 180. *Trifolium repens* L., hvítsmári. — Alg.

GERANIACEAE

181. *Geranium silvaticum* L., blágresi. — Allvíða austan við vatnið, óvíða vestan vatns.

CALLITRICHACEAE

182. *Callitriche intermedia* Hoffm., síkjabruða. — Óvíða. Skútustaðir við Krákárbrú; Litlaströnd við Einslæk; Neslandatangi.
 183. *C. verna* L., vorbrúða. — Sj. Arnarvatn, Garður, Hofstaðaey (H. Hg.).

184. *C. hermaphroditica* L., haustbrúða. — Sj. Grænavatnið að norðanverðu, mikið af henni þar.

VIOLACEAE

185. *Viola palustris* L., mýrfjóra. — Alg.
 186. *V. epipsila* Led., birkifjóra. — Víða.
 187. *V. canina* L., týsfjóra. — Alg.
 188. *V. tricolor* L., þrenningarfjóra. — Óvíða. Álftagerði (A. G.), Garður, Höfði, Reykjahlíð.

ONAGRACEAE

189. *Epilobium collinum* C. C. Gmel., klappadúnurt. — Sj. Grjótagjá (H. Kr.).
 190. *E. palustre* L., mýradúnurt. — Alg.
 191. *E. alsinifolium* Vill., lindadúnurt. — Alg.
 192. *E. anagallidifolium* Lam., fjalladúnurt. — Hér og hvar til fjalla (St. Std.).
 193. *E. lactiflorum* Hausskn., ljósadúnurt. — Sj. Gautlönd; Stóragjá (St. Std.).

HALORAGACEAE

194. *Myriophyllum alterniflorum* L., síkjamari. — Alg. í tjörnum allt í kringum vatnið, Suðurlfói í Mývatni.
 195. *M. spicatum* L., vatnamari. — Alg. í Mývatni.

HIPPURIDACEAE

196. *Hippuris vulgaris* L., lófótur. — Óvíða.

UMBELLIFERAE

197. *Angelica archangelica* L., ætihvönn. — Víða. Álftagerði (A. G.), Skútustaðir (A. G.), víða frá Kálfaströnd til Grímsstaða, alg. um eyjarnar í Mývatni (A. G.), víða meðfram Laxá (H. Hg.).
 198. *Carum carvi* L., kúmen. — Í görðum á Garði og Kálfaströnd.

PYROLACEAE

199. *Pyrola minor* L., klukkublóm. — Óvíða. Álftagerði (A. G.), Höfði, Krafla (St. Std.), Slútnes (St. Std.), Hofstaðir (H. Hg.).
 200. *Ramischia secunda* (L.) Garcke, grænlilja. — Sj. Reykjahlíð, í hrauni (H. Hg.), í skógi austan í Vindbelg.

ERICACEAE

201. *Loiseleuria procumbens* (L.) Desv., sauðamergur. — Alg., a. m. k. norðan vatns.
 202. *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng., sortulyng. — Allvíða. Álftagerði (A. G.), austan við Villingafjall; Kálfaströnd (H. Kr.), Vogar (H. Kr.), Bóndhólshraun (A. G.), Hofstaðir (H. Hg.).
 203. *Harrimanella hypnoides* (L.) Coville, mosalyng. — Alg.
 204. *Calluna vulgaris* (L.) Hull., beitilyng. — Alg.

VACCINIACEAE

205. *Vaccinium myrtillus* L., aðalbláberjalýng. — Óvíða. Á nokkrum stöðum frá Höfða að Reykjahlíð, Gæsadalur (A. G.), við Sandvatn (A. G.), Bóndhólshraun (A. G.), Hofstaðir (H. Hg.).

206. *V. uliginosum* L., bláberjalyng. — Alg.
 207. *Oxycoccus microcarpus* Trucz., mýraberjalyng. — Sj. Álftagerði, mikið í mýri sunnan við bæinn (A. G.), Hrótey (Halldór Ísfieldsson), Langanesið í Neslöndum.

EMPETRACEAE

208. *Empetrum hermafroditum* (Lge.) Hagerup, krækilyng. — Alg.

PLUMBAGINACEAE

209. *Armeria maritima* (Mill.) Willd., geldingahnappur. — Alg.

GENTIANACEAE

210. *Gentiana campestris* L., marfuvöndur. — Alg.
 211. *G. amarella* L., grænvöndur. — Alg.
 212. *G. tenella* Rottb., marfuvendingur. — Alg.
 213. *G. nivalis* L., dýragras. — Alg.
 214. *G. detonsa* Rottb., engjavöndur. — Víða.
 215. *G. aurea* L., gullvöndur. — Allalgengur.
 216. *Lomatogonium rotatum* (L.) A. Br., blástjarna. — Víða.
 217. *Menyanthes trifoliata* L., horblaðka. — Alg.

BORAGINACEAE

218. *Myosotis arvensis* (L.) Hill., gleym-mér-ey. — Nokkuð alg.

LABIATAE

219. *Prunella vulgaris* L., blákolla. — Víða austan vatns, ekki annars staðar.
 220. *Thymus arcticus* (E. Dur.), Ronn., blóðberg. — Alg.

SCHROPHULARIACEAE

221. *Rhinanthus minor* L., lokasjóður. — Alg.
 222. *Bartsia alpina* L., lokasjóðsbróðir. — Alg.
 223. *Euphrasia frigida* Pugsl., augnfró. — Alg.
 224. *Limosella aquatica* L., efjugras. — Sj. Arnarvatn, Framengjar milli Grænavatns og Skútustaða (J. B. S.), Garður.
 225. *Pedicularis flammea* L., tröllastakkur. — Sj. Vindbelgur; hér og hvar til fjalla (St. Std.).
 226. *Veronica serpyllifolia* L., lækjadepla. — Alg.
 227. *V. fruticans* Jacq., steindepla. — Alg.
 228. *V. alpina* L., fjalladepla. — Víða.
 229. *V. scutellata* L., skriðdepla. — Óvíða. Arnarvatn, Skútustaðir (St. Std.), Grænavatn, Hofstaðir (H. Hg.).
 [*V. persica* Poir., varmadepla. — Jarðbaðshólar (J. B. S.)]

LENTIBULARIACEAE

230. *Pinguicula vulgaris* L., lyfjagras. — Alg.
 231. *Utricularia minor* L., blöðrujurt. — Sj. Álftagerði, Skútustaðir, Garður.

PLANTAGINACEAE

232. *Plantago major* L., græðisúra. — Óvíða. Alg. á Vogum og Reykjahlíð, ófundin annars staðar.
 233. *Plantago maritima* L., kattartunga. — Sj. Grænavatnsbruni, austur undir Bláfjallsfjallgarði.

RUBIACEAE

234. *Galium normanii* O. Dahl, hvítmaðra. — Alg.
235. *G. verum* L., gulmaðra. — Alg.

CAMPANULACEAE

236. *Campanula rotundifolia* L., bláklukka. — Sj. Arnarey, Vagnbrekka sunnan undir Belgjarfjalli (Hjálmar Stefánsson), Hofstaðir (H. Hg.).

COMPOSITAE

237. *Erigeron boreale* (Vierh.) Simm., jakobsffill. — Alg.
238. *E. uniflorum* L., fjallajakobsffill. — Sj. Krafla (St. Std.).
239. *Antennaria canescens* (Lge.) Malte, fjallalójurt. — Sj. Haganes (A. G.), Skútustaðir (A. G.), Kálfaströnd (A. G.), Reykjahlíð (St. Std.).
240. *Gnaphalium supinum* L., grámulla. — Víða.
241. *Achillea millefolium* L., Vallhumall. — Alg.
242. *Tripleurospermum maritimum* (L.) Koch., baldursbrá. — Sj. Arnarvatn, Vogar, Reykjahlíð.
243. *Leontodon autumnalis* L., skariffill. — Alg.
244. *Taraxacum spec.*, túnffill. — Alg.
245. *Hieracium islandicum* (Lge.) Dahlst., íslandsffill. — Alg.
246. *H. thulense* Dahlst., skrautffill. — Sj. Slútnes. Vex auk þess aðfluttur frá Slútnesi í Höfða og Reykjahlíð.