

Til Medarbejderne paa Island.

Det vil være af den største Interesse at have en Oversigt over Fuglearernes Fordeling over Island samt over de trækende Arters Ankomst og Afrejse til Sammenligning med de Data, der vindes igennem Ringmærkningen.

Der er nu Medarbejdere fordelt paa 17 adskilte Egne af Landet og indenfor flere Egne endda paa flere Distrikter, saaledes at tilsammen 38 Distrikter er under Observation. Det vil være en betydelig Hjælp i Arbejdet om Medarbejderne hver fra deres Distrikt vil give mig en Oversigt over Forholdene netop der i Overensstemmelse med følgende Spørgsmaal.
Hvilke af disse Fugle træffer man ynglende i Deres Egn? (for hver Art tilføjes sjælden eller alm.

Er der andre Fugle at træffe i Deres Egn? hvilke, og til hvilken Aarstid?

Hvilke Arter træffes hele Aaret hos Dem?

Hvilken Dato ankommer de forskellige Arter om Vaaren?
Hvilken Dato rejser de forskellige Arter om Høsten?

Hvilket Navn bruges for de enkelte Arter i Deres Egn?
Paa vedføjede Islandskort bedes sat et + paa det Sted, for hvilket Deres Oplysninger gælder.

Er der noget Sted i Egnen, hvor enkelte Arter bor i stort Antal (i Koloni), bedes dette Sted betegnet ved en Pil, hvis Spids viser Stedet, og det bedes i Vedtegning bemærket, hvilke Arter der bor i Kolonien og i hvilket Antal ca.

Fuglearten kan blot betegnes ved sit Nr. i følg. Liste.

Paa Island er som Ynglefugle truffet følgende Arter

A. Rovfugle.

- 1) Havørn (*Haliaëtus albicilla*) Ørn, Sæorn.
- 2) Jagtfalk (*Falco gyrfalco*) Falki, Valur.
- 3) Dværgfalk (*Falco æsalon*) Smirill.

B. Spurveagtige.

- 4) Ravn (*Corvus corax*) Hræfn, Krummi.




- 5) Vindrossel (*Turdus iliacus*) **Skogarpröstur.**
 6) Vipstjert (*Motacilla alba*) **Mariðla, Mariatla.**
 7) Engpiber (*Anthus pratensis*) **Grätitlingur, Pufutitlingur.**
 8) Digesmutte (*Saxicola oenanthe*) **Steindepill.**
 9) Gærdesmutte (*Troglodytes parvulus*) **Rindill, Músarbrödir.**
 10) Snespurv (*Emberiza nivalis*) **Snjóítitlingur.**
 11) Graasiken (*Cannabina linaria*) **Audnuititlingur.**
C. Hønsefugle.
 12) Fjældrype (*Lagopus alpina*) **Rjúpa.**
D. Vadefugle.
 13) Hjejle (*Charadrius pluvialis*) **Heidlóa.**
 14) Præstekrave (*Ægialitis hiaticula*) **Sandlóa.**
 15) Stenvender (*Strepsilas interpres*) **Tildra.**
 16) Strandskade (*Hæmatopus ostreologus*) **Tjaldur.**
 17) Lillespove (*Numenius phaeopus*) **Spói.**
 18) Sortgraa Ryle (*Tringa maritima*) **Sendlingur.**
 19) Ryle (*Tringa alpina*) **Loupræll.**
 20) Rødben (*Totanus calidris*) **Stelkur.**
 21) Stor Kobbersneppe (*Limosa ægocephala*) **Jadrakan.**
 22) Horsegøg (*Gallinago scolopacina*) **Myrispita, Hrossagaukur.**
 23) Vandrixé (*Rallus aquaticus*) **Keldusvin.**
 24) Odinshane (*Phalaropus hyperboreus*) **Odinshani.**
 25) Thorshane (*Phalaropus fulicarius*) **Tórshani.**
E. Maagefugle.
 26) Størmsvale (*Procellaria pelagica*)
 27) Stor Størmsvale (*Procellaria Leachii*)
 28) Skrofe (*Puffinus anglorum*) **Skrofa.**
 29) Stormfugl (*Fulmarus glacialis*) **Fyll.**
 30) Havterne (*Sterna macrura*) **Kria.**
 31) Ride (*Larus tridactylus*) **Rita, Skegla.**
 32) Graamaage (*Larus glaucus*) **Grámafur.**
 33) Svartbag (*Larus marinus*) **Veidibjalla, Svartbakur.**
 34) Storkjove (*Lestris catarrhactes*) **Skúmur.**
 35) Kjove (*Lestris parasittica*) **Kjói.**

- F. Andefugle.**
 36) Sangsvane (*Cygnus musicus*) **Alft.**
 37) Blisgaas (*Anser albifrons*) **Grágæs.**
 38) Sædgaas (*Anser segetum*) **Grágæs.**
 39) Graagaas (*Anser cinereus*) **Grágæs.**
 40) Stokand (*Anas boscas*) **Stokkond.**
 41) Spidsand (*Anas acuta*) **Grafönd. (Taumönd).**
 42) Knarand (*Anas strepera*) **Litla Gráönd.**
 43) Krikand (*Anas crecca*) **Urtönd.**
 44) Pibeand (*Anas penelops*) **Raudhöfdaönd.**
 45) Troldand (*Fuligula cristata*) **Skúfönd.**
 46) Bjergand (*Fuligula marila*) **Dükönd (Hrafnsönd).**
 47) Sortand (*Oedemia nigra*) **Hrafnsönd.**
 48) Hvinand isl (*Clangula islandica*) **Húsönd.**
 49) Strømand (*Cosmonetta histrionica*) **Straumönd, Brimönd.**
 50) Havlit (*Pagonetta glacialis*) **Hávella, Fóvella.**
 51) Ederfugl (*Somateria mollissima*) **Ædur, Ædartfugl.**
 52) Stor Skallesluger (*Mergus merganser*) **Stora Toppönd, Gulönd.**
 53) Toppet Skallesluger (*Mergus serrator*) **Littla Toppönd.**
G. Aarefodede.
 54) Sule (*Sula bassana*) **Súla, Hafsúla.**
 55) Skarv (*Phalacrocorax carbo*) **Dilaskarfur.**
 56) Topskarv (*Phalacrörax graculus*) **Toppskarfur.**
 57) Hornet Lappedykker (*Podicipes auritus*) **Sefönd, Flórgidi.**
 58) Islom (*Colymbus glacialis*) **Himbrimi, Brúsi.**
 59) Rødstrubet Lom (*Colymbus septentrionalis*) **Lómur.**
H. Alkefugle.
 60) Lomvie (*Uria troile*) **Lángvia, Svartfugl.**
 61) Kortnæbbet Lomvie (*Uria arra*) **Stuttnefja.**
 62) Tejste (*Cephus grylle*) **Tejsta, Teistukofa.**
 63) Søkonge (*Mergulus alle*) **Háftirdil.**
 64) Lunde (*Fratercula arctica*) **Lundi.**
 65) Alk (*Alca torda*) **Alka, Klumba.**

Resultater fra Studiet af Islandske Fugles Træk.

Foreløbig Beretning med 4 Kort af P. Skovgaard.

Island med Sagaernes Eventyrglans og Hjemsted for utalte Skarer af de Fugle, der om Vinteren kommer til vore sydligere Egne har altid draget mig med sin mangeartede Herlighed, Fuglene især, Fuglefjældenes Vrimmel de øde Vidders Vogtere og Fuglene der delte Hus og Hjem med Øboerne. Rejsende beretter om de mange Fugleunger, der troskyldig færdedes ved Siden af den Vej, hvor Rytterskaren drog frem, det var noget at gæste for den, der føler de trange Kaar, som mange Fugle har her, hvor Kulturen kræver Førsteplads. Og hvor gik fra Island Fugleskarernes Vej over det vildene Hav? Jeg har ikke faaet min Længsel efter Eventyrrejsen til Island opfyldt, men jeg har knyttet Forbindelse med en Del fugleinteresserede Mennesker deroppe og faaet Ringmærkningen i god Gang deroppe, saaledes at nu 38 Personer paa 17 adskilte Distrikter (se Kortet) tager Del i Arbejdet. I de Aar, hvor Arbejdet er vokset fra 1921 og til nu, er mærket 4464 Fugle paa Island og mange Meldinger er indløbet, Meldinger af hvilke mange er ikke mindre eventyrlige end Øen selv. For at se paa de nøgterne Tal saa er Arterne mærket de forskellige Aar i følgende Antal:



<i>Anas crecca</i> 1925/3, 1926/2, 1827/33, 1928/52, 1929/35	Ialt	125
<i>A penelops</i> 1926/10, 1927/112, 1928/77, 1929/95		294
<i>A strepera</i> 1927/1, 1928/9, 1929/18		28
<i>A acuta</i> 1926/10, 1927/36, 1928/4, 1929/11		61
<i>A boscas</i> 1926/2, 1927/2, 1928/31, 1929/23		58
<i>Cygnus musicus</i> 1921/?		?
<i>Fuligula cristata</i> 1927/1, 1928/17, 1929/34		52
<i>F marila</i> 1925/5, 1926/4, 1927/20, 1928/120, 1929/90		239
<i>Clangula islandica</i> 1925/1, 1927/1, 1928/14, 1929/3		19
<i>Pagonetta glacialis</i> 1925/24, 1926/6, 1927/41, 1928/35, 1929/49		155
<i>Cosmonetta histrionica</i> 1927/20, 1928/15, 1929/14		49
<i>Oedemia nigra</i> 1925/5, 1927/8, 1928/26, 1929/18		57
<i>Somateria mollissima</i> 1927/7, 1928/45, 1929/63		115
<i>Mergus serrator</i> 1927/7, 1928/24, 1929/29		60
<i>Anser (segetum?)</i> 1929/6		6

Lagopus alpina 1927/8, 1928/27, 1929/38.....	73
Podicipes auritus 1927/6, 1928/5, 1929/41	52
Colymbus spc. 1927/1, 1928/5, 1929/1	5
Charadrius pluvialis 1925/4, 1926/7, 1927/32, 1928/120, 1929/178	341
Ægialitis hiaticula 1921/?, 1927/5, 1928/6, 1929/19	30
Hæmatopus ostreologus 1928/2	2
Numenius phaeopus 1925/3, 1927/21, 1928/82, 1929/68.....	174
Totanus calidris 1926/1, 1927/14, 1928/15, 1929/28.....	58
Tringa maritima 1928/?, 1929/6.....	6
T. alpina 1927/8, 1928/34, 1929/68.....	110
Phalaropus hyperboreus 1923/3, 1925/3, 1926/1, 1927/41, 1928/132, 1929/212	392
Gallinago scolopacina 1925/2, 1926/2, 1927/31, 1928/79, 1929/70.....	184
Larus tridactylus 1926/47, 1928/8	50
L. marinus 1928/45, 1929/2	47
Sterna macrura 1923/2, 1925/44, 1926/38, 1927/63, 1928/142, 1929/120	409
Lestris parasittica 1928/12.....	12
L. catarrhactes 1927/2, 1928/7.....	9
Uria troile 1926/11, 1928/77, 1929/1.....	89
Alca torda 1928/1.....	1
Fratercula arctica 1923/53, 1924/172, 1928/15, 1929/15	255
Phalacrocorax carbo 1921/?, 1926/1	1
Sula bassana 1921/?.	?
Falco æsalon 1928/3, 1929/2.....	5
F. gyrfalco 1929/3	3
Corvus corax 1928/4, 1929/5	9
Anthus pratensis 1925/17, 1926/5, 1927/36, 1928/98, 1929/182	338
Motacilla alba 1925/11, 1926/9, 1927/8, 1928/118, 1929/88.....	234
Turdus iliacus 1925/1, 1926/4, 1927/10, 1928/41, 1929/104.....	160
Saxicola oenanthe 1925/12, 1927/15, 1928/53, 1929/29	119
Cannabina linaria 1929/1	1
Coccothraustes vulgaris 1929/1	1
Emberiza nivalis 1927/1, 1928/26, 1929/18	45
Total 1921/?, 1923/58, 1924/172, 1925/135, 1926/160, 1927/590, 1928/1547 1929/1802.....	4464

Af de 38 Personer paa Island, der har tilbuddt deres Hjælp til Mærkningerne har følgende taget aktiv Del deri, idet de har mærket det vedføjede Antal Fugle.

J. Sigfinnsson, Myvatn	743	J. Andresen, Husavik	234
B. Gudmundsson, Husavik ...	558	H. Stefansson, Saudarkrok	194
P. Sigurdsson, Husavik.....	470	K. Vilhjamsson, Husavik	190
Th. Jakobsson, Husavik	459	K. N. Wünn, Vopnafjörd	137
G. Juul, Isafjardar	319	Th. Fridgeirsson, Husavik	106
S. Skarphedinsson, Kopasker .	282	P. M. Sigurdsson, Blönduós ..	57
K. Strand, Myvatn	272	S. Jonsson, Akureyri	56

J. L. Einarsson, Tálknafirdi ...	55	E. G. Frydendal, Reydarfjord	26
S. Jonsson, Bardardal	52	D. Brandsson, Myrasysla	22
N. Fridbjörnsson, Husavik ...	42	E. Kristleifsson, Reykholtsgdal.	21
O. Magnusson, Blönduós	38	P. Halgrimsson. Akureyri	18
G. Johannesson, Husavik	37	O. Jonsson, Fellsmula	12
H. Gudmundsson, Vopnafirdi	31	S. K. Harpann, Akureyri	4
M. Jonsson, Saudarkrokur....	28	Tilsammen	4464

Det er med den dybeste Taknemmelighed til alle som har støttet Arbejdet eller taget direkte Del deri, at jeg her frem-lægger dette foreløbige Resultat.

Krikand. (*Anas crecca*). Med 1 Kort.

K 8029 mrkt. 15:VII:1928 i Husavikegnen af Th. Jakobsson skudt August 1928 ved Laurencetown N. Irland iflg. Shooting times 13:X:28.

V 3557 mrk. gl. 30:VII:1927 i Husavikegnen af B. Gudmundsson skudt 25:X:1927 ved Ecrés, Varoville, Calvados France, medd. I Drouet kaldes »Sarcelle«.

V 2080 mrkt 5:VII:1928 gl. Fugl i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. ca. 30:X:1928 paa Longfield flats, Lough Foyle Londonderry Irland Medd. W. Logan der oplyser, at der var 7–800 Pibe- og Krikænder sammen paa de udstrakte Mudderflader paa S. Ø. Bred af Lough Foyle, hvor der er Rastplads for mange Andearter. Krikænder ses hele Aaret, enkelte yngler, ligesaa Stokand, men tidligst i September kommer Trækket og der ses flest i den Maaned, men endnu 18:VII omtales umaadelige Flokke af mange Tusind Pibeænder og Knortegæs med mindre Antal af Stok- og Krikænder samt forskellige andre Gaasearter. Jagten drives fra »shooting punt«. Vibor og Hjerler yngler ogsaa stedvis, men det er altid meget større Antal, der kommer i Løbet af Oktober og November. Kaldes »Teal«.

A 3734 mrkt. 20:VII:1928 i Husavikegnen af B. Gudmundsson sk. ca. 30:X:1928 ved Valado des Frades Portugal iflg. O. Seculo 30:X:28 der indsendes af Dr. Lehrfelder.

V 4035 mrkt. 27:VI:1928 i Fellsmulaegnen af O. Jonsson. sk. 27:XI:1929 ved Cashel, Co. Tipperary, Irland. Medd. C. Kelsall. Ses her regelmæssig Oktober, November til først i December, flest i Oktober, November. Terrainet er Enge med Damme og Sumpe.

X 6472 mrk. 17:VII:1927 i Husavikegnen af Th. Jakobsson taget i Net 7:XII:1927 ved Le grand Ton, St. Ciers Gironde i Sumpe nær. Bordeaux Medd. H Mabile. De ses kun fra September til Marts da Sumpene er tørre om Sommeren. Kaldes »Biganon« »moiret«.

V 4421 mrkt. 24:VIII:1929 i Saudarkrokegnen af H. Stefansson sk. c. 10:XII:1929 i Wigtonshire Skotland iflg. Medd. fra H. F. Witherby.

K 8032 mrk. 2:VIII:1928 i Husavikegnen af Th. Jacobsson. sk. 14:XII:1928 i Northumberland medd. A Dairdson. Der kommer Tusinder af denne Slags til vort Land og af alle mulige Kulører, nogle yngler her. De kaldes »Three duck«.

K 8030 mrk. 3:VII:1928 i Husavikegnen af Th. Jacobsson. sk. 10:I:1929 ved Balinasloe Co Galway, Irland medd. M. L. Colahan.

V 2055 mrk. 24:VI:1927 i Husavikegnen af P. Sigurdsson. sk. c. 20:II:1929 ved Knockmoyleen Streem Ballacroy, Co. Mayo Irland iflg. the Field, 28:II:1929 der indsendes af Th. Teisen.

A 5387 mrk. 15:VIII:1928 i Husavikegnen af B. Guðmundsson sk. Marts 1929 ved Rethy, Prov Anvers Belgien Medd. Grev A. Cornet d'Elzizins de Peissant. Der var mange flere af samme Art i sumpet Terrain. De ses kun fra November til April, flest i Februar, Marts. Kaldes »Sarcelle d'hiver«.

Pibeand, Raudhöfdaönd (*Anas Penelops*). Med 1 Kort.

V 3701 mrk. 17:VI:1928 i Husavikegnen af P. Sigurdsson. sk. 15:IX:1928 paa Orkneyøerne ved en lille Indsø i Damsay Bay of Forth Medd. J. Keldin. Der var 80–100 i Flok, de ses her fra først i September til først i April. Hvis de ikke forstyrres holder de til hele Vinteren i Flokke paa mange Tusinder. I 1928 kom de ca. 14 Dage før de plejer. Yngler meget sjældent paa Hoy; kaldes »Widgeon«. »Whistling duck«

K 8069 mrk. 31:VII:1927 i Husavikegnen af K. Vilhjalmsson sk. 16:IX:1927 ved Achnoba, Lochgilphead, Argyll Scotland. Medd. G. E. Andersen. Der var 4–5 af samme Art blandt flere andre Ænder. De ses som Regel fra Oktober til Marts. I Aar kom de tidligt og har været talrige de sidste Dage.

28:IX saas 50–60 og nogle Stokænder. Flest ses lige før og efter Højvande. De yngler her ikke; kaldes »Widgeon«.

K 8051 mrk. 2:VII:1927 i Husavikegnen af K. Vilhjalmsson sk. 25:IX:1929 ved St. Aidans, Holy Islands Northumberland England, medd. W. G. Watson. Der var flere Hundrede paa Mudderfladerne. De ses fra medio August til medio Marts. Hovedparten kommer i Oktober, yngler sparsomt i nogle Distrikter kaldes »Widgeon« og lokalt »Whew«.

V 3716 mrk. 6:VII:1928 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 28:IX:1928 ved Gerston Bog Halkirk Thurso, Caithness Scotland iflg. The Field 11:X:28, der indsendes af H. F. Witherby.

V 3563 mrk. 17:VII:1927 i Husavikegnen af B. Guðmundsson sk. 5:X:1927 ved Stephensville Crossing New Foundland, medd. Ministeriet for Søfart og Fiskeri New Foundl. ses kun fra Sept. til November kaldes »Widgeon«.

V 4067 mrk. 26:VII:1928 ved Myvatn af K. Strand fundet 7:X:1928 død samme Sted. Medd. K. Strand.

V 2019 mrk. 5:VII:1928 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 8:X:1928 ved Lesmurdie Elgin, Morayshire Scotland. Medd. K. A. W. Johnston. Flest ses fra Oktober til Februar, yngler ved Spynic Loch Nr. Elgin, kaldes »Widgeon«.

V 3909 mrk. 8:VII:1928 i Husavikegnen af B. Guðmundsson sk. 9:X:1928 ved Lough Swilly Co Donegal Irland, medd. J. Harkness. Egnen er udstrakte Mudderflader paa Vestkysten af Lough Swilly, en ideel Ædeplads for Søfugle, der er f. T. Tusinder Knortegæs, Pibeænder, Krikænder, Viber og »Sandpiber« (her vidst Hjejler) de rejser alle i Marts–April. Lough Swilly stiger fra Lavvande i 2 miles Afstand til ved Højvande 20 Yards Afstand fra Huset. Disse store Mudderflader er dækket af Seaweed. Pibeænderne rejser i Løbet af Marts, Gæssene først i April til lidt ind i Maj. Kaldes »Widgeon« eller »wild duck«, de jages med punt guns der skyder 70 i et Skud.

V 2016 mrk. 4:VII:1926 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 14:X:1926 ved Rio Macete ved Udløbet af Rio Odiel Huelva Spanien. Medd. R. Dundras. Stedet er naturlig Saltvandskanal i Landet, der er oversvømmet ved Højvande. Disse

Ænder ses kun fra November til Januar og flest i December, de yngler her ikke, kaldes »Pato Silvon«.

V 4773 mrk. 4:VIII:1929 i Husavikegnen af Th. Jacobsson sk. 19:X:1929 ved Rogerstown Rusch, Co Dublin, Irland. Medd. M. Butterby. Der var 150 Pibeænder i Flok. Stedet er en blød mudret Eng ca. 7 km fra Kysten, nogle ankommer ca. I:IX, flere ca. 15:IX og alle er kommet 15:X, flest ses indtil Januar og alle rejser ca. 17. Marts. F. T. ses de ikke om Dagen, men om Natten her. Kaldes »Widgeon«. Her ses seks Andearter: Pibeand, Stokand, Krikand, Spidsand, Skeand og Taffeland, de kommer alle i første Uge af September og Stokanden er den eneste der yngler her. Pibeanden den eneste, der er talrig, de andre ses kun 5–6 i Flok.

E 840 mrk. 17:VII:1927 i Husavikegnen af Th. Jacobsson sk. 29:X:1928 ved Meuse mellem Remelly og Autrecourt Ardennes France. M. Adolphe Sohy meddeler, at der var fem paa en sumpet Mark de ses kun fra Oktober til Februar, om Vinteren daglig i Flokke fra 5–10 op til 200. Naar Sumpene fryser vender de tilbage til Meuse. Kaldes »Sarcelle«.

V 4777 mrk. 4:VIII:1929 i Husavikegnen af Th. Jacobsson sk. 30:X:1929 i Sumpe N. f. Hamel, Nord, France. Medd. P. Bulté. (Mærkeren angiver, at det er en Pibeand, Meddeleren kalder den Spidsand. Den er taget med her under Pibeand, hvor den i Tid og Sted falder imellem de øvrige meldte).

E 829 mrk. 17:VII:1927 i Husavikegnen af Th. Jacobsson 2:XI:1927 taget af en Kat ved Lock Eye Ross Shire Scotland, Medd. J. Sutherland. Lock Eye er meget besøgt af Wildfowl særlig Pibeænder i Vintermaanederne. De bliver i Søen om Dagen og i Skumringen flyver de til Saltvandsgrundene ved Nigg c. 7 miles > V. Yngler her ikke.

V 2068 mrk. 26:VI:1927 i Husavikegnen af P. Sigurdsson fanget 5:XI:1928 i Fuglekøje ved Nr. Ipswich Suffolk England Medd. J. Bakes. Der var samtidig ca. 350 paa Køjesøen. Pibeænder ses fra Oktober til Marts og flest i November=December. De yngler ikke i Distriktet. I Køjen tages flest Stok-, Krik- og Pibeænder. Stokænderne kommer mest, naar Vejret er meget koldt, naar de fryser ud. Isen paa Køjedammene brydes i Nattens Løb for at holde aabent Vand; efter 4–5

Dages haardt Vejr kommer de saa i Tusinder og der ses ingen Aftagen i Antallet fra Aar til andet i de Ænder, der gæster Køjen. Pibeænderne forbliver aldrig i Køjen, naar den er delvis islagt, men opholder sig da i Floden Oxwell, som er en ideel Flod ca. 2 km fra Køjen. I Reglen fanges 1500 Pibeænder pr. Sæson. Stokænder og Krikænder alt efter Vejret. For 3 Aar siden var Vejret passende og c. 9000 Stokænder, hvoraf Halvdelen Hanner blev taget. Op til 10000 Stokænder er paa een Gang set samlede i Dammen i raakoldt Vejr, naar Vejret bliver mildere gaar Ænderne bort.

K 8052 mrk. 2:VII:1927 i Husevikegnen af K. Vilhjalmsson sk. 14:XI:1927 ved Great Pond Eastham Cape Cod Mass. U. S. Amerika. Medd. G. Herbert Windder, ses her kun fra Oktober til Januar, flest i November, de yngler her ikke, kaldes »Widgeon«, »Bald Pate«.

V 3737 mrk. 25:VI:1929 i Husavikegnen af P. Sigurdsson skudt 27:XI:1929 ved Toomebridge Co Antrim N. Irland, Medd. J. Orr.

A 3778 mrk. 15:VII:1929 i Husavikegnen af K. Vilhjalmsson sk. 29:XI:1929 18 km S. f. Cambridge ved Colston lake Maryland U. S. America, Medd. Biological Survey.

V 2014. mrk. 2:VII:1926 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. I:XII:1926 ved Hawk Point, Cap Sable Island Nova Scotia Canada, Medd. Generalkonsulatet Montreal, Arten ses kun sjældent, 3 Flokke set i December, kaldet Skovand »woodduck«.

V 3849 mrk. 15:VII:1928 i Husavikegnen af Th. Jacobsson sk. 6:XII:1928 ved Keiss Wick Caithness Scotland, Medd. J. Sutherland. I Loch Wester, der er blandet Sø og Flod var der 25–30, de ses fra sidst i Oktober til 1. Marts, flest fra November til Januar kaldes »Widgeon«.

V 3718 mrk. 7:VII:1928 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 14:XII:1928 ved Lock Foyle Irland, Medd. Sawers Limited. Der var en stor Flok. Pibeænderne kommer fra medio eller ultimo September og forbliver til April, de fleste rejser dog i Februar. I Land ses de kun, naar de er drevet ind af Storm. Flokke ses almindelig flyve > Ø i klare Maanenætter ved Afrejsen, man mente alm., at de ynglede i Rusland. Alle de gamle rejser i Februar, mens en Del Unge forbliver til April

Jages med Smaakanoner med 1/4 Pd. Krudt og der skydes kun i Flokkene. Kaldes »Widgeon«.

E 821 mrk. 17:VII:1927 i Husavikegnen af Th. Jacobsson sk. 23:XII:1928 ved Ravenna Italien, Medd. L. Giardini.

V 2010 mrk. 23:VI:1926 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 24:XII:1926 ved Lock Tarbet Argyllshire Skotland, Medd. C. G. Duffin. Der var ca. 300 i en smal Saltvandsfjord, ses kun fra 20:IX til April, flest i December, Januar. Yngler her ikke, kaldes »Widgeon«.

V 3905 mrk. 8:VII:1928 i Husavikegnen af B. Gudmundsson sk. 25:XII:1928 ved Laitburn, Invergordon Rossire Scotland Medd. G. Dairdson. En Gang kom de i stort Antal til denne Del af Skotland, med i de sidste 7–8 Aar ses de meget mindre talrige her, kaldes »Widgeon«.

V 2037 mrk. 17:VI:1927 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 27:I:1929 ved Ladys Island Lake Co Wexford Irland, Medd. G. B. Cooke. Det er en Ferskvandssø.

V 3861 mrk. 21:VII:1928 i Husavikegnen af Th. Jacobsson sk. 1:II:1930 ved Kirkwall Orkney Isles Medd. J. M. Croy

V 3892 mrk. 30:VII:1928 i Husavikegnen af Th. Jacobsson sk. 15:II:1929 ved Wyrefloden Fleetwood, Lancashire England Medd. H. Ainsworth.

V 2045 mrk. 18:VI:1927 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 8:III:1929 ved Rugby. Warwickshire England, Medd. H. V. Hunt. De ses her kun i haardt Vejr, i Aar synes flere end sædvanlig vel p. Gr. af den haarde Vinter. Der har været Flokke paa 100 og en paa 30 paa Avon Floden her, som er det eneste aabne Vand i miles Omkreds. Vilde Gæs ses meget sjældet, men i Aar er de set her. Pibeænderne ses fra November til Marts. Med meget daarligt Vejr af Ø forekommer Ænderne, især Stokænder fra Lincolnshire. Pibeænderne er ikke set før.

E 832 mrk. 17:VII:1927 i Husavikegnen af Th. Jacobsson 18:V:1929 fundet død paa Mærkningsstedet vist slaaet af en Falk. Th. Jakobsson.

E 825 mrk. 17:VII:1927 i Husavikegnen af Th. Jacobsson sk. 12:VII:1928 i Omegnen af Bogorodizk, Tula Rusland, Medd. W. Podarewsky.

V 5254 mrk. 27:VII:1928 ved Vopnafirdi af H. Gudmundsson sk. 1929. Smst.

Knarand, Litla Graönd (*Anas strepera*)

V 3539 mrk. 10:VII:1927 i Husavikegnen af K. Vilhjalmsson sk. 26:X:1927 nær Rye Sussex England. Medd. G. Manning den var ene i Marsk med Grøfter. De ses her kun om Vinteren som sjælne Gæster og Høst, kaldes »Gadwell«.

V 3724 mrk. 23:VII:1928 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 27:I:1929 ved Currandulla, Co Galway Irland, Medd. C. J. Kerin.

V 3723 mrk. 23:VII:1928 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. c. 12:II:1930 ved Lough Glove. Co Westmeath Irland, Medd. P. Fagan.

V 3841 mrk. 29:VI:1928 i Husavikegnen af Th. Jacobsson 10:VII:1929 taget paa Reden af en Hund Smsts. Th. Jacobsson.

Spidsand, Grafönd (*Anas acuta*).

E 501 mrk. 24:VII:1927 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 4:IX:1927 Samme Sted. Medd. P. Sigurdsson.

E 507 mrk. 17:VI:1926 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 25:IX:1926 ved Hornborgasjön, Västergötland, Sverrig Medd. E. Lönnberg. Yngler ikke her og ses vist fra sidst i Juli, flest i Oktober, kaldes »Stjärtand«. G. Pettersen.

V 3720 mrk. 23:VII:1928 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 8:XII:1928 ved Clonmorayh, Rathangan Co Kildare Irland Medd. S. Malone. Spidsænder gæster i stort Antal vore lavtliggende, oversvømmede Enge ved Vintertid, de ses fra Oktober til Marts og flest fra November til Januar, men ikke som ynglende. De ses ikke i haard Frost og i meget tørt Vejr, da de vist gaar til Kysten. I Aar har Vejret været meget gunstigt, men der har alligevel været færre, kaldes »pin-tail duck«, »pintail widgeon« (er mulig Knarand som P. Sigurdsson opgiver.)

E 503 mrk. 17:VI:1926 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 11:XII:1927 ved Lough Atalia, Galway Irland, Medd. P. King.

E 509 mrk. 17:VI:1926 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 16:I:1927 ved Ballydaheen, Castletown Roch, Co Cork, Irland. Medd. D. Noonan. Egnen er Marsk og den laa i en

Dam sammen med en Stokand. Ses i December, Januar, Februar, men ikke ynglende, kaldes »Lacan Fian«.

Troldand, Skufönd (*Fuligula cristata*).

X 6802 mrk. 25:VI:1927 ved Laxa af K. Vilhjalmsson sk. 11:VIII:1928 ved Nortwich Cheshire England. Medd. A. W. Boyd, skudt paa Witton Flashes en oppumpet Oversvømmelse, hvor der hele Sommeren er set ca. 20 Troldænder, der dog menes ikke at have ynglet. Troldand ynglede dog for 20 Aar siden i Cheshire.

Bjergand, Dukönd (*Fuligula cristata*).

E 661 mrk. 1:VIII:1928 i Husavikegnen af Th. Jacobsson fanget 12:X:1928 i Hoornsche meer te Hoorn Holland i Bundergarn, Medd. K. Lely.

D 1433 mrk. gl. 27:VI:1925 ved Myvatn af J. Sigfinnsson yngler 1926 i sin gl. Rede. J. Sigfinnsson. 30:X:1926 sk. ved Belfast Irland, Medd. W. Martin, de træffes her fra November til Marts, kaldes »Scaup duck«.

V 3719 mrk. 5:VII:1928 i Husavikegnen af B. Guðmundsson sk. før 10:XI:1928 ved Kysten udfor Duncormich Co Vexford Irland iflg. Shooting times 10:XI:1928, der indsendes af C. B. Cooke. Der var mange ca. 100 i Marsk mellem salt og fersk Vand, de ses kun fra Oktober til Maj og flest i November til April. De ses i Tusindvis maaske Titusindvis og er nu paa Sørerne nær Havet, de kaldes »Widgeon«, koster 1 sh. pr. Stk.

D 1432 mrk. 26:VI:1928 ved Myvatn af J. Sigfinnsson sk. 30:XI:1928 ved Kampen i Zeudersøen, Medd. C. G. B. ten Kate. Kaldes »Blaarkop« p. Gr. af de hvide Pandepletter. K 8057 mrk. 10:VII:1927 i Husavikegnen af K. Vilhjalmsson sk. Januar 1928 ved Monbach ved Rhinen nær Mainz, Medd. H. Kübler. Der saas i de Dage flere saadanne, og denne Art holdt sig for sig selv.

E 511 mrk. 22:VII:1927 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 23:I:1929 i Belfast Lock Irland, Medd. H. Dunseath. De kommer i Oktober og rejser sidst i Februar eller først i Marts, men det afhænger af Vinterens Forhold. I Øjeblikket er de i den haarde Frost meget talrige i Belfast Lough og Strangford Lough. De søger Føde paa Muslingebankerne ved Ky-

sten ved Ebbe. Der er ogsaa mange andre Ænder, en meget større sort og hvid, ogsaa Krikand, Pibeand og maaske nogle faa af vore hjemlige Stokænder. Stokanden yngler her og ses hele Aaret dog meget faatallige i denne Sæson. Vibe har været her i talløse Skarer i de forløbne 2 Maaneder I og II af 1929, men meget faa skydes, da de er i meget sølle Tilstand og har svært ved at finde Føden i det kolde Vejr.

V 5453 mrk. gl. 3:VII:1929 ved Myvatn af K. Strand sk. 3:II:1930 ved Makkum, Friesland Holland, Medd. G. Kooij.

V 3698 mrk. 22:VII:1928 i Husavikegnen af Th. Jakobsson fundet c. medio Februar 1929 ved en Dam ved Trewern, Newbridge Cornwall England. Medd. R. W. King. De ses kun om Vinteren, kaldes »Widgeon«, formodes skudt.

V 4028 mrk. gl. 8:IX:1928 ved Laxa af J. Andresen sk. 23:II:1929 ved Tillsbury Irland. Medd. W. H. Workmann

E 665 mrk. 1:VIII:1928 i Husavikegnen af Th. Jakobsson sk. 3:VIII:1929 i Nigg Bay Kilary, Ross shire Scotland, Medd. G. B. Cooke.

Havlit, Havella, Fovella (*Pagonetta glacialis*).

D 1509 mrk. 15:VII:1928 ved Myvatn af J. Sigfinnsson sk. 27:V:1929 tæt Syd for Christiansaab Koloni, Grønland, Medd. Grønlands Styrelse.

D 1416 mrk. 22:VI:1925 ved Myvatn af J. Sigfinnsson fanget 1927 ynglende samme Sted. J. Sigfinnsson.

Strømand, Straumönd, Briemönd (*Cosmonetta histrionica*).

V 3865 mrk. 21:VII:1928 i Husavikegnen af Th. Jakobsson sk. medio November 1928 ved Akranes N. f. Reykjavik iflg. Morgunbladid 18:XI:28, der indsendes af R. Hørring.

Sortand, Hrafnsönd, (Oedemia nigra). Se Kortet.

E 844 mrk. 18:VII:1927 i Husavikegnen af Th. Jakobsson taget af Falk Smsts. i Efteraaret 1927. Medd. Th. Jakobsson.

E 846 mrk. 18:VII:1927 i Husavikegnen af Th. Jakobsson sk. 24:X:1927 ved Ponta Delgada St. Michels Azorerne. Medd. E. dos Reis Rebêlo. Der var 2 ved en Indsø, ses fra Oktober til Marts og flest i December-Januar. Ofte i Havnen, men hyppigere i Indsørerne, yngler ikke paa Azorerne, kaldes »Marrecac«.

E 240 mrk. gl. 26:VI:1925 ved Myvatn af J. Sigfinnsson
fanget 1927 Samme Sted. Ynglende. Medd. J. Sigfinnsson.

Ederfugl, Edur (*Somateria mollissima*).

V 3400 mrk. 3:VI:1928 i Blönduosegnen af P. M. Sigurdsson
fundet død 9:I:1929 i Raudaravik iflg. Morgunbladid 12:I:1929,
der indsendes af R. Hørring.

E 695 mrk. 22:VI:1927 i Husavikegnen af B. Gudmundsson
sk. 10:II:1928 nær Husavik, Ringen indsendt anonym.

Skallesluger, Litla Toppönd (*Mergus serrator*).

V 4054 mrk. gl. 6:VII:1928 ved Myvatn af K. Strand
sk. 20:II:1930 ved Lemmer Friesland Holland Med F. H. v.
d. Brink. De kommer først i November og rejser medio April
flest ses i Januar og Februar yngler her ikke, men mulig
oversomrer enkelte, kaldes »Penduiker«, »middelste Zaagbek«.
V 4837 mrk. gl. 3:VII:1928 ved Talknafirdi af J. L. Einarsson
sk. 3:IV:1929 Smst. Medd. J. L. Einarsson.

Rype, Rjupa (*Lagopus alpina*).

X 2757 mrk. mrk. 25:VII:1928 i Husavikegnen af P. Sigurdsson
sk. November 1928, samme Sted. P. Sigurdsson.

K 8009 mrk. 5:VIII:1927 i Husavikegnen af Th. Jakobsson
sk. 3:XI:1927 ved Litla Fellsøxe, Akrafjall nær Reykjavik iflg.
Morgunbladid 3:XI:1927 modtaget fra Redaktionen.

K 6350 mrk. 29:VII:1928 ved Saudarkrok af H. Stefansson
sk. 1:XII:1928 ca. 3 km derfra. H. Stefansson.

K 8050 mrk. 2:VII:1927 i Husavikegnen af K. Vilhjalmsson
sk. 10:XII:1927 i Seljadal, Mosellssveit nær Reykjavik iflg.
Morgunbladid.

Islom, Himbrimi Brusi (*Colymbus glacialis*).

E 771 mrk. 12:VII:1928 i Saudarkrokegnen af M. Jonsson
fanget 23:VII:1928. Samme Sted. Medd. K. P. Briem.

Hjejle, Heidloa (*Charadrius pluvialis*). Med 1 Kort.

A 5511 mrk. 22:VI:1929 i Akureyriegnen af S. Jonsson
sk. 5:VIII:1929. Samme Sted. Medd. S. Jonsson.

A 5136 mrk. 29:VI:1928 ved Sandarkrok af H. Stefansson
fundet 10:VIII:1928 i Dværgfalkrede 8 km derfra. H. Stefansson.

X 8102 mrk. 13:VII:1928 ved Saudarkrok af M. Jonsson
fundet 14:IX:1928 død under Telefon i Nærheden. Medd.
M. Jonsson.

X 2788 mrk. 16:VII:1929 i Husavikegnen af P. Sigurdsson
14:IX:1929 fundet død samme Sted. Medd. P. Sigurdsson
G 3091 mrk. 6:VIII:1929 i Husavikegnen af K. Vilhjalmsson
sk. 12:X:1929 ved Canal de Lucon N. f. Rochelle i Frankrig
af Flok p. 2-300, Medd Channeu Riber Terrainet er her en
Sump gennemskaaret af Kanaler og Diger, var tidligere over-
svømmet. Hjejler kommer meget talrige i Sumpene her under
det store Træk i Oktober, November, man ser dem overalt,
naar de kommer fra deres nordlige Egne. De er meget lidt
sky man kommer dem let nær, lidt efter lidt bliver de mere
sky og utilnærmelige, de er da i store Flokke og overflyver
længe et Terrain før de slaar sig ned. De foretrækker af-
mejede Enge eller Enge, hvor Kvæget har afgræsset. Om
Natten holder de til i Pløjemarker eller ved Havets Bred,
der her paa Kysten er meget mudret. Imellem Træktiderne
er Hjejlerne mindre talrige, men viser sig altid med vekslende
Temperatur. Naar man ser dem talrige er det for os et sik-
kert Tegn paa, at der nogle Dage senere vil blive Regn, Storm,
Nordenvind eller Frost. Jeg har lagt Mærke til, at i en vis
Egn trækker alle Flokke til de Steder, hvor der i Forvejen
er Hjejler samlet. De slaar sig sommetider ned mellem Vibor,
naar de er faa, men aldrig blandt andre Fugle. Ved Foraarets
Komme sidst i Februar skifter de Dragt og sidst i Marts
eller først i April, naar de forlader os, er de næsten helt sorte
og kaldes »Morsacs«, kaldes ellers »Pluvier«. Deres Fløjt er
da mindre skarpt, men mere hæst. De ses fra sids i Septem-
ber til April, flest tra 15:X til 15:XI og fra 15:II til 15:III,
men yngler her ikke.

X 6466 mrk. 4:VII:1927 i Husavikegnen af Th. Jacobsson
fundet 21:X:1927 ved Tullarvan Kilkenney, Irland, formenes
taget af en Rovfugl. Medd. T. V. Healy mids. De ses alm.
her i Oktober, November, naar Vejret bliver stormfuldt og
vinterligt. Kaldes »golden plover«.

X 6463 mrk. 4:VII:1927 i Husavikegnen af Th. Jakobsson
sk. ca. 22:X:1927 ved Ballinamore Co Leitrim Irland, Medd.
C. E. O. Beirns, der var 2 paa et Bjerg. De ses ikke hele
Aaret, men kun lejlighedsvis i Oktober, November og De-
cember og flest i November, man kender intet til Ynglen

her, kaldes »golden plover«. De træffes i Bjergmoser og Heder.

X 3640 mrk. 29:VI:1928 i Myra sysla af D. Brandsson sk. først i Oktober 1929 paa Irland, den var bragt til Torvs i Dublin sammen med andre Hjejler. Medd. G. R. Humphreys.
X 2732 mrk. 28:VI:1926 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 3:XI:1926 ved Bihoues Coudarn Gers France iflg. Chasseur Francais 1927 S. 11.

X 2728 mrk. 27:VI:1926 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 4:XI:1926 i Kings County, Irland, iflg. Shooting times 13:XI:1926, Medd. H. F. Witherby.

A 5517 mrk. 23:VI:1929 i Akureyriegnen af S. Jonsson sk. ca. 1:XII:1929 ved Solway sands nær Wigton paa V. Ky-
sten af Skotland, iflg. Daily News 9:XII:1929, der indsendes af G. D. Sinclair. I Northumberland ses de i Antal i Vin-
termaanederne i Flokke paa 2–300 Stkr., der holder til paa
Græs og Stubmarker sammen med Viber.

A 3130 mrk. 30:VI:1929 i Saudarkrok af H. Stefansson sk. 15:XII:1929 nær Lissabon i Portugal. Medd. H. Gibert.

A 3126 mrk. 24:VI:1929 i Husavikegnen af H. Stefansson sk. 26:XII:1929 ved Cloughmills, Co Antrim N Irland, Medd.

J. Glegg.

X 3298 mrk. 26:VII:1929 ved Myvatn af J. Sigfinnsson sk. 6:I:1930 ved Hoornby Castle Lancaster, England. Medd. H. F. Witherby.

X 6871 mrk. 5:VII:1929 i Husavikegnen af B. Guðmundsson sk. 6:I:1930 paa Harpin Island Carrigaloe Co Kork, Irland. Medd. C. Ó. Leary. Der var 100 Hjejler, er f. T. meget alm. alle Jægere er ude efter dem. Øen er meget moset. De ses ikke hele Aaret, men December, Januar og Februar, flest i Februar. Yngler i Bjergegnene, kaldes »golden Plover«. Spø-
ven yngler her ogsaa.

X 2734 mrk. 24:VI:1927 i Husavikegnen af P. Sigurdsson sk. 30:I:1928 paa Spanish Island ved Baltimore Co Kork, Ir-
land. Medd. W. Hackett.

X 6450 mrk. 11:VII:1927 i Husavikegnen af Th. Jakobsson sk. 1:II:1928 ved Dooyork Geesala Ballina Co Mayo, Irland. Medd. E. Magnan.

A 3723 mrk. 4:VII:1928 i Husavikegnen af B. Guðmundsson sk. ca. 3:II:1930 ved Kings Lynn Norfolk, England. Medd. C. f le Page.

A 3642 mrk. 3:VII:1928 i Myrssysla af D. Brandsson sk. c. 16:II:1929 ved Walada do Ribotejo, Portugal. Medd. Dr. L. Lehrfelder, kaldes »Tarambola«.

X 6451 mrk. 11:VII:1927 i Husavikegnen af Th. Jakobsson sk. 19:II:1928 nær S. Martinho do Porto, Estremadura, Distr. Leiria, Portugal, Medd. J. F. Rebolo Pinto. Der var en Flok paa ca. 200 i sumpet Terrain. De ses fra de sidste Dage af Oktober til først i April, flest fra 15:XI til 15:III, de yngler her ikke, kaldes »Tarambola«. De ankommer efter den første store Regn sidst i Oktober eller først i November, formenes at gøre Rejsen over Havet, thi de ses altid først ved Skræn-
ten ved Havets Bred, hvorpaa de trækker mod de sumpedde Egne. Træffes mest i store Flokke dog ankommer de i smaa Grupper, der straks søger at slutte sig til andre tidligere an-
komne. Jægerne kan derfor kalde dem til sig med en lille Fløjte. Flokke paa 2–400 ses ofte, jages meget. Straks skydes de let og flygter end ikke for Skudet, men de bliver snart sky og er vanskelige at komme paa Skud. De forlader os, naar Terrainet tørres i Marts.

G 7432 mrk. 15:VII:1929 ved Reydarfirdi af E. G. Frydendal 22:II:1930 taget af en Høg ved Moniaive Dumfriesshire Scotland. Medd. T. W. Kennedy Moffat. Egnen er græsbevokset Højland 4–1600 Fod over Havet, de ses f. T. daglig der, al-
mindeligt fra Februar til September, de yngler i Distrikter. I September flokkes de og trækker mod Kysten, kaldes »gol-
den Plover«.

A 3748 mrk. 29:VI:1928 i Husavikegnen af Th. Jakobsson sk. 17:III:1929 i Sumpe ved L'Etang de Berre Bouches du Rhone France, iflg. Chasseur français 1929 S. 359.

X 8075 mrk. 4:VII:1928 ved Laxa af J. Andresen sk. 12:IV:1929 ved Tirce Inner Hebrides, Scotland. Medd. H. G. Witherby.

Lillespove, Spøi. (*Numenius phaeopus*). Se Kortet.
A 3779 mrk. 16:VII:1929 i Husavikegnen af K. Vilhjalmsson 28:VIII:1929 taget af Falk i Nærheden. Medd. Th. Jakobsson.

X 6852 mrk. 4:VIII:1927 i Husavikegnen B. Gudmundsson sk. 11:IX:1927 ved Rochefort s mer Charante inferieure France Medd. A. Bonican. Den var ene ved en lille Fiskedam, Spøver ses hele Aaret og er meget alm. De fleste er dog større end denne og nu er de meget talrige, men denne Art er ikke alm., flest ses fra Juli til December. De yngler ikke i Egnen.
X 6498 mrk. 18:VII:1928 i Husavikegnen af Th. Jakobsson sk. 21:X:1928 ved Havgstenen 2 km N. f. Dakar i Senegal iflg. Chasseur français 1929 S. 13.

Horsegøg, Hrossagaukur. (*Gallinago scolopacina*).

G 5862 mrk. 23:VII:1929 ved Akureyri af S. Jonsson 5:VIII:1929 taget af Falk samme Sted. Medd. S. Jonsson.
G 5303 mrk. 2:VII:1929 i Husavikegnen af H. Stefansson sk. før 5:XI:1929 ved Claremorris Co Mayo, Irland. Medd. H. F. Witherby.
G 3880 mrk. 25:VI:1928 i Myrasysla af D. Brandsson sk. ca. Februar 1930 ved Ballina Co Mayo, Irland, iflg. Shoting times, indsendt af J. Bartholeme.

Svartbag, Veidubjalla, Svartbakur. (*Larus marinus*).

E 234 mrk. 15:VII:1928 nær Kopasker. J. Andresen sk. 2:X:1929 ved Hofsós N. Island. Medd. A. H. Pálsson.
E 1218 mrk. 15:VII:1928 nær Kopasker af J. Andresen sk. 26.X:1928 ved Seidisfjord. Medd. Simonarsson.
K 6121 mrk. 27:VI:1928 i Husavikegnen af N. Fridbjørnsson 3:I:1929 opskyllet død paa Nord Uist Skotland. Medd. M. Mac Donald.

Alk, Alka (*Alca torda*).

A 5423 mrk. gl. 16:VI:1928 ved Talknafirdi af J. L. Einarsson 17:III:1929 fundet død samme Sted. J. L. Einarsson.

Lunde, Lundi. (*Fratercula arctica*) alle mrk. gl. paa Ynglested.

V 4339 mrk. 21:VI:1928 Bjarnarney Vopnafirdi af K. N. Wünn 28:VI:1929 f. død Smsts. af K. N. Wünn.

D 606 D 355 mrk. 1924 Vigur i Isafjardar af G. Juul. genf. **D 613 D 361** Smsts. 23.VII:1925 som ynglende. Medd. G. Juul.

D 639 mrk. 1924 Vigur i Isafjardar af G. Juul. fanget Juli 1925 p. Drangey i Skagafjord. Medd. K. M. Lindgreen
X 1871 mrk. 8:VIII:1923 Vigur Isafjardar G. Juul fanget I:VIII:1925 Smsts. G. Juul.

Jagtfalk. (*Falco gyrfalco var islandica*).

B 338 mrk. 2:VI:1929 i Husavikegnen af K. Vilhjalmsson medio Juli 1929 fundet død Smsts. Medd. K. Vilhjalmsson. Engpiber, Spurv, Pufutitlingur, Gratitlingur. (*Anthus pratensis*).
Eur 21630 mrk. 23:VI:1929 Talknafirdi af J. L. Einarsson 26:VI:1929 fundet død samme Sted. Medd. J. L. Einarsson. Eur 6752 mrk. 15:VI:1929 ved Myvatn af J. Sigfinnsson fanget 29:X:1929 ved Oosthoven Turnhout, Anvers Belgien. Medd. Direktion Mussee royal D'histoire Naturelles, Bryssel. Eur 21644 mrk. ved Talknafirdi 26:VI:1928 af J. L. Einarsson sk. før 19:XI:1928 ved Penaroyo Cordoba, Spanien. Medd. Generalkonsulatet i Madrid.

Vindrossel, Skogarpörstur. (*Turdus iliacus*.)

* 354 mrk. 24:IV:1928 i Husavikegnen af P. Sigurdsson 4:X:1929 fundet død samme Sted af P. Sigurdsson.

Vipstjert, Marierla (*Motacilla alba*).

Eur 21634 mrk. Talknafirdi 11:VII:1929 af J. L. Einarsson ca. 25:VII:1929 fundet død paa modsatte Side af Fjorden. Medd. J. L. Einarsson.

Eur 19221 mrk. 16:VI:1928 i Myrasysla af D. Brandsson fanget 5:IX:1928 udmattet paa et Skib, der laa paa Fiskeri ved Rockall. Medd. V. E. Glegg.




Typen af de anvendte Ringe


De vedføjede Kort viser:

- I. Genfangststeder for Krikænder (*Anas crecca*) mærket paa Island — og til Sammenligning er ogsaa indtegnet Genfangststeder for Krikænder mærket paa Høststræk paa Fanø. Genfangststederne er forbundet med de resp. Mærkningssteder.
- II. Genfangststeder for Hjejler (*Charadrius pluvialis*) mærket paa Island.

I.



II.



Kortene viser:

- III. Genfangststeder for Pibeænder (*Anas penelops*) mærket paa Island.
Linerne angiver kun Retningen til Island. Genfangstdatoer vedføjet.
- * Genfangststeder for Lillespove (*Numenius phaeopus*) mærket p. Island
 - + Genfangsted for Sortand (*Oedëmia nigra*).

VI. Oversigtskort over Island med Mærkningspladserne indtegnet.

